


Lịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Theo công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 23/6/2022 về việc hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và công văn 1899/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 10/6/2022 về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2




Trẻ em

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm **2** mũi 
- Mũi 2 cách mũi 1: **4 tuần**
- Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì tiêm **sau mắc bệnh 3 tháng**



Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

- Tiêm **3** mũi 
- Mũi 2 cách mũi 1: **3-4 tuần**
- Mũi 3 cách mũi 2: **5 tháng**
- Nếu trẻ đã nhiễm COVID-19 thì tiêm **sau mắc bệnh 3 tháng** và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng

Người lớn

Mũi cơ bản



- Mũi 2 cách mũi 1 theo khuyến cáo của nhà sản xuất (tùy loại vắc-xin)
- Nếu mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế

Mũi nhắc 1 (mũi 3)

- Ít nhất **03 tháng** sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
- Nếu mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế

Mũi nhắc 2 (mũi 4)

- Ít nhất **04 tháng** sau mũi nhắc 1 (mũi 3)
- Nếu mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 thì tiêm **sau mắc bệnh 3 tháng** và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3



Lịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Theo công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 23/6/2022 về việc hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và công văn 1899/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 10/6/2022 về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2

Người có tình trạng suy giảm miễn dịch

Mũi bổ sung (không phải mũi 3)

- Cách mũi cuối cùng của liều cơ bản **từ 28 ngày đến 3 tháng**
- Đối tượng:
 - Người có suy giảm miễn dịch vừa đến nặng
 - Người cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế miễn dịch
 - Người điều trị bằng liệu pháp thụ thể kháng thể tế bào T hoặc cấy ghép tế bào gốc
 - Người suy giảm miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nặng
 - Người nhiễm HIV tiến triển hoặc không được điều trị
 - Người đang điều trị tích cực corticosteroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch liều cao
 - Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Sinopharm (Vero cell) hoặc Sputnik V
- Nếu mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế

Phụ nữ mang thai

- Phụ nữ mang thai từ 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ, lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa
- Tiêm theo lịch tiêm của người lớn



Truy cập địa chỉ: hcdc.vn/diemtiemvx
để tra cứu địa điểm tiêm vắc xin phòng
COVID-19 gần nhất



"Tiêm nhắc đúng lịch,
duy trì miễn dịch"

