

7 biện pháp phòng chống BỆNH CÚM A (H5N1)

~~A (H5N1)~~

Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cúm A(H5N1) lây từ gia cầm sang người, người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

Dùng thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi như Chloramin B hoặc các chất khác theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Rửa tay bằng xà phòng sau khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn.



Khi phát hiện gia cầm bệnh, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.



Đảm bảo ăn chín, uống chín.

Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở sau khi tiếp xúc gia cầm (sử dụng, nuôi, giết mổ, vận chuyển, mua bán....) phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.



Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc nghi bị bệnh cúm.



Sử dụng gia cầm, sản phẩm từ gia cầm có nguồn gốc xuất xứ, đã qua kiểm dịch.