

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

SAU KHI TIÊM CHỦNG

1 Theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm



**Ở lại điểm tiêm chủng
30 phút** sau khi tiêm
để được cán bộ y tế theo dõi,
phát hiện sớm các phản ứng
sau tiêm chủng

Khi về nhà, nơi làm việc:
chủ động theo dõi sức khỏe
bản thân **trong vòng
3 tuần** sau tiêm



Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân,
là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 SAU KHI TIÊM CHỦNG

2

Bạn có thể gặp một số dấu hiệu thông thường sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 như:



sốt



mệt mỏi



đau đầu



ớn lạnh



đau cơ



đau khớp,
tăng cảm giác đau



ngứa



sưng, đỏ,
đau tại chỗ tiêm



bồn chồn...

Đây là các phản ứng thông thường sau khi tiêm, cho biết cơ thể bạn đang tạo ra miễn dịch phòng bệnh COVID-19

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 SAU KHI TIÊM CHỦNG

3 Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 là hiếm gặp

Dấu hiệu nghiêm trọng: xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19



Ở miệng:

tê quanh môi và/hoặc lưỡi...



Ở da:

phát ban, mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da...



Ở họng:

ngứa, căng cứng, tắc nghẹn, khàn đặc...



Đường tiêu hóa:

nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng...



Đường hô hấp:

thở dốc, thở khò khè, thở rít, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho...



Toàn thân:

mạch yếu, chóng mặt, choáng/xây xẩm, cảm giác muốn ngã...

Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, nếu bạn gặp phải các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

SAU KHI TIÊM CHỦNG

4 Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 là hiếm gặp

Dấu hiệu thông thường diễn biến nặng lên:



sốt cao $\geq 39^{\circ}\text{C}$



sưng/đỏ lan rộng
tại chỗ tiêm



tăng huyết áp
hoặc tụt huyết áp
hoặc kẹt huyết áp



đau cơ dữ dội...

Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, nếu bạn gặp phải các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân,
là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095