

# THÔNG TIN CẦN BIẾT VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM

## KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT

- ❁ Là vắc xin bất hoạt, phòng bệnh do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Sau khi tiêm vào cơ thể, vi rút bất hoạt trong vắc xin kích thích sản xuất kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
- ❁ Hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79% (theo kết quả nghiên cứu lâm sàng).
- ❁ **Tên vắc xin:**  
Vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt (tên khác là vắc xin SARS-CoV-2 (VeroCell) bất hoạt) của Sinopharm.
- ❁ **Nhà sản xuất:**  
Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd., China National Biotec Group (CNBG)/Sinopharm – Trung Quốc.



## PHÊ DUYỆT VẮC XIN

- Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) ngày 15/2/2021.
- Tại Việt Nam: vắc xin COVID-19 (Vero Cell) của Sinopharm được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 03/6/2021.

Cập nhật tháng 10/2021

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19  
là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng!**



Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**  
Cổng thông tin tiêm chủng: **<https://tiemchungcovid19.gov.vn>**



# THÔNG TIN CẦN BIẾT VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM

## KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT

### 🌸 LỊCH TIÊM CHỦNG



Chỉ định tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên.



Mỗi liều tiêm 0,5ml, tiêm bắp.



Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 - 4 tuần.

### 🌸 CHỐNG CHỈ ĐỊNH

*(Theo Hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất cập nhật tháng 8/2021)*



Có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.



Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vắc xin như Hydroxit nhôm.



Người bị động kinh không kiểm soát hoặc các bệnh thần kinh cấp tính và có tiền sử bị hội chứng Guillain-Barre.

### 🌸 TIÊM CHỦNG ĐỒNG THỜI CÙNG CÁC VẮC XIN KHÁC



Chưa đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vắc xin COVID-19 (Vero Cell) của Sinopharm với vắc xin phòng COVID-19 khác. Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19.



Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách 14 ngày với tiêm chủng các vắc xin khác.

Cập nhật tháng 10/2021

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19  
là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng!**



Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**  
Cổng thông tin tiêm chủng: <https://tiemchungcovid19.gov.vn>



# THÔNG TIN CẦN BIẾT VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM

## KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT

### Tiêm chủng vắc xin COVID-19 (Vero Cell) cho một số nhóm đối tượng đặc biệt



**Người từ 60 tuổi trở lên:** Hồ sơ hiệu quả và an toàn của vắc xin không được đầy đủ vì chỉ có một số lượng nhỏ người trên 60 tuổi tham gia trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, ở các nhóm tuổi lớn, tính sinh kháng thể sau tiêm vắc xin COVID-19 (Vero Cell) là tương tự như ở người trẻ tuổi. Cần cân nhắc việc sử dụng vắc xin này ở người lớn tuổi và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng.



**Người mắc bệnh nền:** khuyến nghị tiêm chủng cho những người mắc bệnh nền có nguy cơ bị nặng nếu bị nhiễm COVID-19.



**Phụ nữ mang thai:** đã ghi nhận dữ liệu về tính an toàn của vắc xin, bao gồm cả ở phụ nữ có thai. Cho đến khi có dữ liệu để đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch ở phụ nữ có thai, WHO khuyến cáo sử dụng vắc xin COVID-19 (Vero Cell) của Sinopharm cho phụ nữ có thai khi lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ rủi ro.



**Phụ nữ cho con bú:** đây không phải là vắc xin vi rút sống nên không có khả năng gây ra nguy cơ cho trẻ bú mẹ. Hiệu quả của vắc xin tương tự giữa phụ nữ đang cho con bú và những người trưởng thành khác. WHO không khuyến nghị ngừng cho con bú sau khi tiêm vắc xin.



**Người có HIV:** có thể tiêm vắc xin nếu thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng. Cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ đối với từng cá nhân. Không cần thiết phải xét nghiệm HIV trước khi tiêm vắc xin.



**Người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch:** có thể tiêm vắc xin nếu thuộc nhóm nguy cơ. Cung cấp cho nhân viên y tế thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch để được tư vấn về lợi ích và rủi ro cũng như theo dõi, đánh giá sau tiêm chủng.



**Người đang điều trị nhận kháng thể đơn dòng hoặc đang dùng huyết tương như một phần của điều trị COVID-19:** nên hoãn tiêm chủng ít nhất 90 ngày.



**Người bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó:** có thể tiêm vắc xin sau 6 tháng khỏi bệnh.

Cập nhật tháng 10/2021

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19  
là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng!**



Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**  
Cổng thông tin tiêm chủng: <https://tiemchungcovid19.gov.vn>



# THÔNG TIN CẦN BIẾT VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM

## KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG

Các biến cố bất lợi ghi nhận được hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn.

### Phản ứng tại chỗ tiêm



**Rất thường gặp:** đau ở chỗ tiêm;



**Ít gặp:** đỏ, sưng, cứng, ngứa;



**Hiếm gặp:** ban đỏ.



### Phản ứng toàn thân



**Rất thường gặp:** đau đầu.



**Thường gặp:** sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp, ho, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa. - **Ít gặp:** chóng mặt, chán ăn, đau hầu họng, khó nuốt, chảy nước mũi, táo bón, quá mẫn cảm.



**Hiếm gặp:** phản ứng dị ứng cấp tính, hôn mê, buồn ngủ, khó ngủ, hắt hơi, viêm mũi họng, nghẹt mũi, khô họng, cúm, giảm cảm giác, đau chân tay, đánh trống ngực, đau bụng, phát ban, niêm mạc da bất thường, mụn trứng cá, đau mắt, đau tai, nổi hạch.



**Rất hiếm gặp:** ớn lạnh, rối loạn chức năng vị giác, mất vị giác, dị cảm, run, rối loạn chú ý, chảy máu cam, hen suyễn, kích ứng cổ họng, viêm amidan, khó chịu, đau cổ, đau hàm, u cổ, loét miệng, đau răng, rối loạn thực quản, viêm dạ dày, phân đổi màu, mờ mắt, kích ứng mắt, căng thẳng, tăng/hạ huyết áp, tiểu không kiểm soát, chậm kinh nguyệt.

**Không có dữ liệu về phản ứng phản vệ.**

Cập nhật tháng 10/2021

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19  
là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng!**



Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**  
Cổng thông tin tiêm chủng: **<https://tiemchungcovid19.gov.vn>**



# THÔNG TIN CẦN BIẾT VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM

## TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VERO CELL CỦA SINOPHARM TẠI VIỆT NAM

### Chỉ định tiêm vắc xin

 ● Không có điểm bất thường cần hoãn tiêm hoặc chống chỉ định.

● Lịch tiêm gồm 2 mũi:

🌸 Mũi 1: tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

🌸 Mũi 2: tiêm từ 3 - 4 tuần sau mũi 1.



● Tiêm bắp, liều lượng 0,5ml cho 1 mũi tiêm.

### Chống chỉ định tiêm

 ● Có tiền sử phản ứng nặng phản vệ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào.

● Chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất:

 🌸 Có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.

 🌸 Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vắc xin như Hydroxit nhôm

Cập nhật tháng 10/2021

**Tiêm vắc xin phòng COVID-19  
là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng!**



Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**  
Cổng thông tin tiêm chủng: **<https://tiemchungcovid19.gov.vn>**

